

Подход к диагностике ПУ/ПД



EDUVET.RU



Проект "Инструкция
к действию"

Автор: Дарья Грачева,
2025 год

Этап 1. Подтверждение ПУ/ПД:

- Потребление воды более 100мл/кг/сут
- Выделение мочи более 50 мл/кг/сут
- Удельный вес мочи менее 1.012

Этап 2. Анамнез и клинический осмотр

Исключи
ятрогенные
ПУ/ПД

Не
кастрированная
самка? – исключи
пиометру

Лимфаденопатия?
– исключи
гиперкальцемию

Пальпация ЩФ – при
объеме тут заподозри
гипертиреоз, первичный
гиперпаратиреоз

Потеря веса, ПФ,
беспокойство,
тахикардия? – исключи
гипертиреоз и СД

Аллопеция, отвисший живот,
тонкая кожа с/без кальцинатов,
гипотрофия мышц и мышечная
слабость, гепатомегалия? –
исключи ГАК

Этап 3. ОАМ

Глюкозурия

При
нормогликемии? -
ОКН, ППГ

При
гипергликемии?
- СД

Пиурия, бактериурия? – исключи
пиелонефрит, пиометру

Значительная протеинурия?
- Исключи болезни почек, пиометру

Подход к диагностике ПУ/ПД

Этап 4. Оценка удельного веса мочи

Менее 1,006

Вероятны: ЦНД, ННД, психогенная жажда, с-м Кушинга

1,007-1,030

Может быть характерно для любого из ДД

Более 1,030

Вероятна психогенная жажда

Этап 5. Определение базовых данных

ОКА: Исключи полицитемию, лейкоцитоз (мб характерен для пиелонефрита, пиометры)

БХ: Исключи болезнь почек (азотемической стадии), печеночную недостаточность, обрати внимание на маркеры ГАК

Электролиты: Исключи гиперкальциемию, гипокалиемию, классическое течение б-ни Аддисона

T4 (для кошек – рутинно, для собак при подозрении на гипертиреоз) исключи гипертиреоз.

УЗИ, R: исключи пиометру, ГАК, обрати внимание на печень, почки

Есть данные за ГАК?

- СККМ
- МДП

Этап 6.

Нет данных за ГАК? Данные говорят о другом диагнозе?

Этап 7. Модифицированный тест с водной депривацией или пробная терапия десмопрессином