

Острая задержка мочи. Алгоритм действий

Оценка состояния

Осмотр

Сбор анамнеза

состояние крайне тяжелое критическое:
все действия направлены на стабилизацию жизненно важных функций

Сознание
ЧСС
ЧДД
АД
Температура тела
ЭКГ

Активное согревание: грелки, фен, растворы
Коррекция АД: болюсы, вазотоники
Коррекция причин аритмий

Цели терапии:
Восстановление уровня сознания
Нормализация температуры тела
Нормализация АД
Восстановление сердечного ритма
Разрешение электролитного дисбаланса
Разрешение метаболических нарушений

Пальпация живота
Осмотр области промежности
УЗИ AFAST

Декомпрессионный цистоцентез:
снижение давления в мочевом пузыре
разрешение компартмент синдрома
восстановление СКФ

Калий, Натрий, Хлор
Глюкоза крови
Креатинин
Мочевина
Газы крови
Лактат

Коррекция электролитных нарушений
Коррекция метаболических отклонений
Контроль водного баланса
Анальгезия
Обеспечение кормления

Восстановление диуреза естественным путем
Анальгезия
Контроль гидратации
Разрешение причины обструкции
Профилактика рецидива

Состояние средней тяжести и тяжелое: допустимо амбулаторное лечение

Диагностика

Рентгенография:
Обзорно брюшная полость
Область промежности
Ретроградная урография: опционально

Общий анализ мочи
Посев мочи на чувствительность
к антибиотикам

УЗИ брюшной полости
КТ: опционально
МРТ: опционально

Клинический анализ крови
Биохимический анализ
крови с электролитами

Анальгезия и коррекция стресса

Метамизол
НПВС: мелоксидил, робеноксиб
Не применять при ОПП, особенно I стадия по IRIS
Габапентин
Опиоиды
Золазепам+ тилетомин
Альфа – агонисты: метомидин, дексдомитор
Лидокаин

Спазмолитики:
Тамсулозин: действие на внутренний сфинктер
Сирдалуд: действие на наружный сфинктер
Габапентин: действие на мочевой пузырь и уретру

Коррекция стресса:
ТЦА/СИОЗ – смотри таблицу
БАД на основе трав:
кошачья мята, лаванда, мататаби
БАД на основе капаземина
БАД на основе феромонов лицевых
желез

Модификация среды

Кошки:
Вводить изменения постепенно
После разрешения острого периода



Собаки:
Обеспечить более частый выгул для опорожнения мочевого пузыря
Обеспечение комфортного помещения при подозрении на заболевания опорно – двигательного аппарата

Диета: учитывает основное заболевание

Собаки:
При сохранении выраженной кристаллурии после разрешения
ОЗМ при высоком удельном весе мочи
При уролитиазе

Кошки:
Вводить изменения постепенно
Не убирать резко привычный корм
После разрешения острого периода
При сохранении выраженной кристаллурии после разрешения ОЗМ при
высоком удельном весе мочи
При уролитиазе



Проект "Инструкция
к действию"

Автор: Надежда Крутицкая, 2025 год